


AKUTNA FEBRILNA REAKCIJA TIJEKOM TRANSFUZIJE

AKUTNA TEMPERATURA > 39 °C

i/ili porast ≥ 1 °C u odnosu na početnu vrijednost izmjerenu na početku transfuzije

INICIJALNI POSTUPAK

1. Zaustaviti transfuziju.
2. Provjeriti vitalne znakove pacijenta.
3. Ponovno provjeriti identifikaciju jedinice krvi, rok trajanja i vizualno pregledati na promjenu boje ili prisutnost čestica.



AHTR Akutna hemolitička transfuzijska reakcija	TTI Transfuzijom prenosiva infekcija / kontaminacija	FNHTR Febrilna nehemolitička transfuzijska reakcija
• potporna terapija • KKS, uk. bilirubin, urea, kreatinin • odrediti parametre koagulacije (PV i APTV) • provjera bilirubinurije Analiza jedinice krvi: • postoje li znakovi hemolize i/ili citološki znakovi mikrobne kontaminacije?	• potporna terapija + primjena antimikrobnih pripravaka širokog spektra Analiza jedinice krvi: • napraviti krvni razmaz (postoje li znakovi hemolize ili citološki znakovi mikrobne kontaminacije?) • napraviti hemokulturu (aerobno + anaerobno)	• ponovno započeti transfuziju istom ili sporijom brzinom • nema dokaza koji preporučuju primjenu antipiretika kod pasa i mačaka ⚠ NE koristiti paracetamol kod mačaka!